



AEROSOL MATA CARCOMA 650cc/500ml

Ficha técnica



MATA CARCOMA AEROSOL

Protector de madera frente a xilófagos (carcoma y termitas) de aplicación directa mediante pulverización o inyección por cánula para tratamientos preventivos y curativos.


N.º de Registro: ES/BB(NA)-2021-08-00759

Campo de aplicación: Uso doméstico

Aspecto : Aerosol

Envasado: Aerosoles de 650cc/500mL en cajas de 12uds

Permetrina 0,14% (p/p)



Nombre químico:

3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Número CAS: 52645-53-1

Disolvente nafta 36,826%

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No respirar los aerosoles.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

INDICACIONES DE PELIGRO

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH208 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH066 Contiene Permetrina . Puede provocar una reacción alérgica.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento preventivo de madera maciza (madera blanda) para uso clase 1 (UC 1) contra insectos perforadores de la madera.

Tratamiento preventivo:

Aplicación superficial: Spray con dispensador de aerosol RTU de mano.

Dosis: 250 ml/m² (200 g/m²). Después de la aplicación del producto, se deben respetar 12 horas antes de tomar contacto con la madera tratada. Si es necesario, se pueden aplicar como tratamiento en la madera y se deben respetar 12 horas adicionales (24 horas en total).

No aplique el producto más de una vez al año.

Tratamiento curativo:

Tratamiento superficial: Aplicación superficial. Rocíe con un dispensador de aerosol RTU de mano.

Dosis: 250 ml/m² (200 g/m²)

Tratamiento intensivo: Aplicación de inyección con un dispensador de aerosol RTU de mano en un número de orificios controlable y existente, utilizando una cánula o tubo capilar suministrado con el recipiente. Aplicar en combinación con tratamientos superficiales.

Dosis: inyección hasta 400 ml/m² (320 g/m²).

Después de la aplicación del producto, se deben respetar 12 horas antes de tomar contacto con la madera tratada. Si es necesario, se pueden aplicar como tratamiento en la madera y se deben respetar 12 horas adicionales (24 horas en total).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.